


TVS-N - Tidlig varslings-skår-nyfødte

RESPONSSKJEMA

Observasjon	RØD	GUL	HVIT	GUL	RØD
Respirasjon (pust/min)	≤ 25	26 - 29	30 - 60	61 - 79	≥ 80
Pressing		Ja	Nei	Ja	
Postduktal SpO2 (%)	≤ 89	90 - 94	≥ 95		
Puls (slag/min)	≤ 79	80 - 94	95 - 160	161 - 174	≥ 175
Spising (etter første 4 t)			Spiser godt	Spiser dårlig	Spiser ikke
Nevrologi			Normal tonus og atferd	Hypoton / sitrer / irritabel	Svært hypoton / uvekkbar / kramper
Temperatur (°C)	≤ 35,9	36,0 - 36,4	36,5 - 37,5	37,6 - 37,9	≥ 38,0
Bekymring (foreldre/ helsepersonell)		Ja	Nei	Ja	

Blodsukker (mmol/l)		0 - 4 t: ≤ 1,4 4 - 24 t: ≤ 1,9 > 24 t: ≤ 2,5	0 - 4 t: ≥ 1,5 4 - 24 t: ≥ 2,0 > 24 t: ≥ 2,6
---------------------	--	--	--

Lavt blodsukker:
Se prosedyre for hypoglykemi



Barn som har hatt minst to separate unormale (gule eller røde) TVS-N-skår på ulike tidspunkt skal skåres videre tilsvarende barn med risikofaktorer for infeksjon

Hvis du er bekymret for tilstanden til et barn, fortsett overvåkning og tilkall barnelege uavhengig av skåringsverdier.

Calling: 949014

TVS-N, nasjonal utgave, oppdatert 19.03.2023
lokal oppdatering med kontaktinfo: 21.6.2023