

## RISIKOFAKTORER

**ALLE nyfødte scores med TVS-N ved 2 timers alder**

Pasient-ID (barnets navnelapp)

INGEN RISIKOFAKTORER   Ingen flere skåringer

### Risiko for infeksjon

- Vannavgang > 18 t, kun scoring ved 6+12 t
- Mor GBS i urin, **ikke** adekvat behandlet\*
- Korioamnionitt
- Minst 2 unormale verdier i scoringskjema
- OBS! GBS-infeksjon hos tidligere barn innlegges 3D

\*Første dose min 4 timer før forløsning.

\*Disse barna skal være innlagt minst 48 t

TVS-N også 6-8 + 12 + 24 t alder

### Føtal distress/asfyksi/intrapartum

- pH < 7,05 i navlearterie
  - BE ≤ -12 mmol/l i navlearterie
  - Aktivt ventilert lengre enn 5 min
  - Apgar <7 ved 5 min
  - Tykt misfarget fostervann\*
- \*Ved tykt misfarget fostervann og minst 1 kryss ekstra: overflyttes 3D

\*Mekoniumaspirasjon og pat. CTG/sectio/lav apgar/intubert/GA>42 uker skal tilses av lege ved 1 t alder

TVS-N også 1 + 6-8 t alder

Risiko for lavt blodsukker  
+  
Følg prosedyre for hypoglykemi

### Risiko for lavt blodsukker

- Minst 1 kryss på "føtal distress/asfyksi/intrapartum"
- Maternell diabetes (se prosedyre)
- Maternell bruk av beta-blokker (ikke trandate)
- FV > 4500 g eller FV <2500 g
- SGA (se 2,5 percentil NATUS)
- Født før uke 37

Følg prosedyre for hypoglykemi

Rhesus-immunisering

Obs gulsott og anemi

Mistanke om syndrom

Varsle barnelege

Vakuumbforløsning  
obs. subgalealt hematom/økende hevelse

Sjekk hode rett etter fødsel + 2 t

### Barn som skal ha legetilsyn/konferering med barnelege UMIDDELBART

Synlig gulsott / over behandlingsgrense < 24 timers alder

Gallefarget oppkast

Apnèer

Mistanke om kramper

Annet nyfødt barn man oppfatter som sykt

Se prosedyre ID 47725, kriterier for overflytning av barn fra Føde/barselavd

SKÅRINGSSKJEMA TVS-N - Tidlig varslingsskår-nyfødte

Handling	Hvit obs	Fortsette observasjoner som planlagt			Pasient-ID (barnets navnelapp)				
	1 gul obs.	Varsle jordmor og revurder om 30 minutter							
	2 gule / 1 rød	Umiddelbart varsle vakthavende barnelege og ansvarlig							
	2 røde / 1 rød på nevrologi	Umiddelbart tilkalle vakthavende barnelege og varsle ansvarlig jordmor							
Født dato: kl:		Forløsningsmetode:							
GA:	Apgar (1-5-10 min):	Lengde	Vekt	HO					
Skriv når barnet skal observeres f.eks. "full skår 2, 6-8, 12 og 24 timer" eller "kun blodsukker ihht prosedyre":									
		Første 4 levetimer		4 - 24 levetimer			> 24 levetimer		
Sign. jordmor/barnepleier									
Dato									
Klokkeslett									
A B	Respirasjons- frekvens (telles i 1 minutt)	80							
		70							
		60							
50									
40									
30									
R E S P I R A S J O N	Pressing	Ja Nei							
	Postduktal SpO <sub>2</sub> (fot)	≤ 89 %							
		90-94 %							
≥ 95 %									
C S I R K U L A S J O N	Puls i hvile	180							
		170							
		160							
		150							
		140							
		130							
		120							
		110							
		100							
		90							
D A T F E R D	Spising (ikke første 4 levetimer)	Ikke							
		Dårlig							
		Bra							
Neuro	Svært hypoton/uvekkbar/kramper Hypoton/sitrer/irritabel Normal tonus og atferd								
	Temperatur* ny scoring 30 minutter etter tiltak	38							
		37							
		36							
Bekymring (foreldre/personale)	Ja								
	Nei								
Blodsukker (kun på indikasjon, se prosedyre for hypoglykemi)	≥ 2,6								
	2,0-2,5								
	1,5-1,9								
	1,1-1,4								
	≤1,0								
Skriv inn tallverdien på observasjonene i aktuell kolonne. På pressing, spising, atferd og bekymring marker med X i aktuell kolonne.									

TVS-N, nasjonal utgave, oppdatert 6.6.2023